トレーシングレポート通信

中国労災病院 薬剤部

今回のトレーシングレポート通信は 相互作用と副作用についての事例です!

No.12 2023年4月号

事例①:ジェニナック®錠と沈降炭酸カルシウム錠による 相互作用の報告

49歳 女性 内科 ジェニナック[®]錠200mg 1回2錠 1日1回 昼食後

☞気管支炎に対し、ジェニナック®錠が処方されたが、他院で沈降炭酸カルシウム錠を服用中。ニューキノロン系薬剤と金属イオンがキレートを 形成し、効果が減弱されるため服用タイミングをずらすよう指導した。

	□ 継続の必要性が乏しい薬剤についての情報提供(ポリファーマシー等)						
	□ 服薬状況	☑ 他院処方(重複、相互作用	目) □ 副作用(重篤でないもの)				
報	□ 経口抗がん剤	□ 手技:自己注射	□ 手技:吸入薬				
告	□オピオイド	□ その他 ()				
🗖							
	情報提供・提案事項						
内		⁷ で透析をされており、	現在、沈降炭酸カルシウム錠				
	○○クリニック		現在、沈降炭酸カルシウム錠 B用しています。ジェニナック®釒	淀と			
内容	○○クリニック 500mg 1回2錠	と、1日3回毎食直後に肌	β用しています。ジェニナック®釒				
	○○クリニック 500mg 1回2錠 同時服用で吸収	、1日3回毎食直後に服 双低下を起こすため、3		以上			

薬剤部より

情報提供ありがとうございます。内容を確認し、 カルテ記載で主治医へ報告しました。



『その後

ジェニナック®錠内服後、気管支炎の症状は改善し、内服終了となった。

ニューキノロン系薬剤と金属イオン含有薬剤との併用は有名な相互作用ですが、 他にも相互作用のある薬剤は多くあります。主治医が他院処方について把握していない場合があるので、必要に応じて他院処方の薬歴やお薬手帳のコピーを 添付して送ってください。他院の併用薬の把握が容易になります。

事例②:タリージェ®錠による浮腫の疑い

79歳 男性 整形外科 リリカ®OD錠75mg 1回1錠 1日1回 寝る前 リリカ®OD錠25mg 寝る前 1回1錠 1日1回 変更 1回1錠 1日2回 朝·夕食後

タリージェ®錠5mg

☞リリカ®OD錠の服用で十分な効果が得られず、タリージェ®錠へ変更となっ たが、浮腫が出現し患者から相談の電話あり。タリージェ®錠による浮腫が疑 われたため、主治医へ服用について確認。

	□ 継続の必要性が乏しい薬剤についての情報提供(ポリファーマシー等)				
	□ 服薬状況	□ 他院処方(重複、相互作用)	☑ 副作用(重篤でないもの)		
北口	□ 経口抗がん剤	□ 手技:自己注射	□ 手技:吸入薬		
報	□ オピオイド	□ その他 ()		
告					
	情報提供・提案事項				
内	串考から雷託に	て「タリージェ®錠を飲	み始めて、3、4日前から足がむく		
容			いたいて、S、 TIBM りたがして いありました。タリージェ®錠によ		
			いて指示をお願いします。		
	る 分 2月	るんめ、水田の酢にし	ん、く日小での娘いしまり。		

薬剤部より

情報提供ありがとうございます。 電話にて主治医に確認し、タリージェ®錠中止、残薬 のリリカ®錠再開の指示がありました。



☞ その後

タリージェ®錠中止後、浮腫は改善。リリカ®錠を再開したが、疼痛の悪化は見ら れなかった。

薬剤の変更後に副作用が疑われた事例でした。 副作用の程度に合わせてトレーシングレポートを活用して下さい。 緊急と考えられる場合は疑義照会で問い合わせてください。

事例③:副作用発現より薬剤の中止を提案

76歳 男性 内科・整形外科 トラゼンタ®錠5mg				
デベルザ®錠20mg 1回1錠 1日1回 朝食後 1回1錠 1日1回 朝食後 1回1錠 1日1回 朝食後 1日1回 朝食後 1回1錠 1日1回 朝食後 1回1力プセル 1日1回 朝食後 1回1カプセル 1日1回 朝食後 1回1カプセル 1日1回 朝夕食後 1回1錠 1日2回 朝夕食後 1回2カプセル 1日2回 朝夕食後 でミティーザ®カプセル12μg 1回2カプセル 1日2回 朝夕食後 マグミット®錠250mg 1回1錠 1日2回 昼夕食後 パントシン®錠200mg 1回1錠 1日3回 毎食後 1中2 1日3回 毎食後 1回2錠 1日3回 毎食後 1回1錠 1日3回 毎食後 1回1錠 1日3回 毎食後 1回1錠 1日3回 毎食後 1回1錠 1日1回 就寝前 パルシオン®錠0.25mg 1回1錠 1日1回 就寝前 パルシオン®錠0.25mg				
フロセミド錠20mg 1回1錠 1日1回 朝食後 タムスロシンOD錠0.2mg 1回1錠 1日1回 朝食後 エディロール®カプセル0.75μg 1回1カプセル 1日1回 朝食後 ファモチジンOD錠20mg 1回1錠 1日2回 朝夕食後 ニフェジピンCR錠20mg 1回1錠 1日2回 朝夕食後 アミティーザ®カプセル12μg 1回2カプセル 1日2回 朝夕食後 マグミット®錠250mg 1回1錠 1日2回 昼夕食後 パントシン®錠200mg 1回1錠 1日3回 毎食後 パントシン®錠200mg 1回1錠 1日3回 毎食後 トアラセット®配合錠 1回2錠 1日3回 毎食後 レバミピド錠100mg 1回1錠 1日3回 毎食後 センノシド錠12mg 1回1錠 1日1回 就寝前 ハルシオン®錠0.25mg 1回1錠 1日1回 就寝前		1回1錠	1日1回	朝食後
タムスロシンOD錠0.2mg 1回1錠 1日1回 朝食後 エディロール®カプセル0.75μg 1回1力プセル 1日1回 朝食後 ファモチジンOD錠20mg 1回1錠 1日2回 朝夕食後 ニフェジピンCR錠20mg 1回1錠 1日2回 朝夕食後 アミティーザ®カプセル12μg 1回2カプセル 1日2回 朝夕食後 マグミット®錠250mg 1回1錠 1日2回 昼夕食後 パントシン®錠200mg 1回1錠 1日3回 毎食後 トアラセット®配合錠 1回2錠 1日3回 毎食後 ロキソプロフェンNa錠60mg 1回1錠 1日3回 毎食後 レバミピド錠100mg 1回1錠 1日3回 毎食後 センノシド錠12mg 1回1錠 1日1回 就寝前 ハルシオン®錠0.25mg 1回1錠 1日1回 就寝前	' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	1回1錠	1日1回	朝食後
エディロール®カプセル0.75μg 1回1カプセル 1日1回 朝食後 1回1カプセル 1日1回 朝夕食後 1回1錠 1日2回 朝夕食後 1回1錠 1日2回 朝夕食後 1回1錠 1日2回 朝夕食後 1回2カプセル 1日2回 朝夕食後 1回2カプセル 1日2回 朝夕食後 1回1錠 1日2回 昼夕食後 パントシン®錠250mg 1回1錠 1日3回 毎食後 1円2錠 1日3回 毎食後 1回2錠 1日3回 毎食後 ロキソプロフェンNa錠60mg 1回1錠 1日3回 毎食後 レバミピド錠100mg 1回1錠 1日3回 毎食後 センノシド錠12mg 1回4錠 1日1回 就寝前 ハルシオン®錠0.25mg 1回1錠 1日1回 就寝前		1回1錠	1日1回	朝食後
ファモチジンOD錠20mg 1回1錠 1日2回 朝夕食後 ニフェジピンCR錠20mg 1回1錠 1日2回 朝夕食後 アミティーザ®カプセル12μg 1回2カプセル 1日2回 朝夕食後 マグミット®錠250mg 1回1錠 1日3回 昼夕食後 パントシン®錠200mg 1回1錠 1日3回 毎食後 トアラセット®配合錠 1回2錠 1日3回 毎食後 ロキソプロフェンNa錠60mg 1回1錠 1日3回 毎食後 レバミピド錠100mg 1回1錠 1日3回 毎食後 センノシド錠12mg 1回4錠 1日1回 就寝前 ハルシオン®錠0.25mg 1回1錠 1日1回 就寝前		1回1錠	1日1回	朝食後
コフェジピンCR錠20mg 1回1錠 1日2回 朝夕食後 1回2カプセル 1日2回 朝夕食後 1回2カプセル 1日2回 朝夕食後 マグミット®錠250mg 1回1錠 1日3回 昼夕食後 パントシン®錠200mg 1回1錠 1日3回 毎食後 1回2錠 1日3回 毎食後 ロキソプロフェンNa錠60mg 1回1錠 1日3回 毎食後 レバミピド錠100mg 1回1錠 1日3回 毎食後 センノシド錠12mg 1回1錠 1日1回 就寝前 ハルシオン®錠0.25mg 1回1錠 1日1回 就寝前		1回1カプセル	1日1回	朝食後
アミティーザ®カプセル12μg 1回2カプセル 1日2回 朝夕食後 マグミット®錠250mg 1回1錠 1日2回 昼夕食後 パントシン®錠200mg 1回1錠 1日3回 毎食後 トアラセット®配合錠 1回2錠 1日3回 毎食後 ロキソプロフェンNa錠60mg 1回1錠 1日3回 毎食後 レバミピド錠100mg 1回1錠 1日3回 毎食後 センノシド錠12mg 1回4錠 1日1回 就寝前 ハルシオン®錠0.25mg 1回1錠 1日1回 就寝前		1回1錠	1日2回	朝夕食後
マグミット®錠250mg 1回1錠 1日2回 昼夕食後パントシン®錠200mg 1回1錠 1日3回 毎食後トアラセット®配合錠 1回2錠 1日3回 毎食後ロキソプロフェンNa錠60mg 1回1錠 1日3回 毎食後レバミピド錠100mg 1回1錠 1日3回 毎食後センノシド錠12mg 1回4錠 1日1回 就寝前ハルシオン®錠0.25mg 1回1錠 1日1回 就寝前	··- 0		1日2回	朝夕食後
パントシン®錠200mg 1回1錠 1日3回 毎食後 トアラセット®配合錠 1回2錠 1日3回 毎食後 ロキソプロフェンNa錠60mg 1回1錠 1日3回 毎食後 レバミピド錠100mg 1回1錠 1日3回 毎食後 センノシド錠12mg 1回4錠 1日1回 就寝前 ハルシオン®錠0.25mg 1回1錠 1日1回 就寝前	. •	1回2カプセル	1日2回	朝夕食後
トアラセット®配合錠 1回2錠 1日3回 毎食後 ロキソプロフェンNa錠60mg 1回1錠 1日3回 毎食後 レバミピド錠100mg 1回1錠 1日3回 毎食後 センノシド錠12mg 1回4錠 1日1回 就寝前 ハルシオン®錠0.25mg 1回1錠 1日1回 就寝前	1	1回1錠	1日2回	昼夕食後
ロキソプロフェンNa錠60mg 1回1錠 1日3回 毎食後 レバミピド錠100mg 1回1錠 1日3回 毎食後 センノシド錠12mg 1回4錠 1日1回 就寝前 ハルシオン®錠0.25mg 1回1錠 1日1回 就寝前	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1回1錠	1日3回	毎食後
レバミピド錠100mg 1回1錠 1日3回 毎食後 センノシド錠12mg 1回4錠 1日1回 就寝前 ハルシオン®錠0.25mg 1回1錠 1日1回 就寝前		1回2錠	1日3回	
センノシド錠12mg 1回4錠 1日1回 就寝前 ハルシオン®錠0.25mg 1回4錠 1日1回 就寝前		1回1錠	1日3回	
ハルシオン®錠0.25mg 1回1錠 1日1回 就寝前		1回1錠	1日3回	毎食後
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		1回4錠	1日1回	就寝前
ヘルノムフ [®] 椞15Mg 1回1錠 1口1同 お寝前			1日1回	
1月1班 1月1日 机技制	へルソムフ [®] 延15mg	1回1錠	1日1回	就寝前

☞右大腿骨頚部骨折の術後、トアラセット®配合錠内服中に嘔気が現れ、内服中止を提案。

□ 薬剤継続の必要性について(ポリファーマシー等)	□ 服薬状況	
□ リフィル処方箋 🔽 副作用(重篤でないもの)	□ 他院処方(重複、相	互作用)
□ 抗がん剤(□ 経口 □ 注射)	□ オピオイド	
□ 手 技(□自己注射□吸入薬□その他)	□ その他 ()
情報提供・提案事項		
推奨しましたが、足が不自由なので自力で病院に	こ行くことは不可能との	ことでした。そこで、
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
みの憎悪もないことが確認できています。訪問者	重護師やヘルパーさんと	も密に連絡を取りな
がら、細かい対応に努めております。1カ月後に	受診されますのでよるし	くお願いします。
	□ リフィル処方箋 ☑ 副作用(重篤でないもの) □ 抗がん剤 (□ 経口 □ 注射) □ 手 技 (□ 自己注射 □ 吸入薬 □ その他) 情報提供・提案事項 電話にてフォローアップ中に、「最近吐き気を見が上がってきたのでムカムカを抑える薬を用意し推奨しましたが、足が不自由なので自力で病院に現在痛みは緩和していることもあり、処方薬のセット®配合錠の服用をやめてみることを提案し合錠を中止後の経過について情報収集を行っているの憎悪もないことが確認できています。訪問者	 □ リフィル処方箋 ■ 副作用(重篤でないもの) □ 抗がん剤(□経□□注射) □ オピオイド □ 手 技(□自己注射□吸入薬□その他) □ その他(

薬剤部より

情報提供ありがとうございます。内容を確認し、カルテ 記載で主治医へ報告しました。



☞その後

トアラセット®配合錠中止後、嘔気は改善し、疼痛の悪化はなかった。 現在もロキソプロフェンNa錠のみで疼痛コントロールしている。

テレフォンフォローでトアラセット®配合錠による副作用が疑われ、中止となった事例でした。フォローアップ中、副作用が疑われる場合があれば、報告をお願いします。