今回のトレーニングレポート通信は副作用の事例と処方変更の事例です！

No.15
2023年7月号

事例①：副作用疑いによる薬剤の減量

処方

85歳 女性 整形外科

リリカ®OD錠25mg 1回1錠 1日2回 昼食後・寝る前

↓増量

リリカ®OD錠75mg 1回1錠 1日1回 寝る前

リリカ®OD錠25mg 1回1錠 1日1回 昼食後

☞リリカ®OD錠増量後、姿勢の歪みと前傾歩行があり、リリカ®OD錠の副作用が疑われる。

保険薬局より

報告内容	☐ 薬剤継続の必要性について(ポリファーマシー等)	☐ 服薬状況
	☐ リフィル処方箋 ☒ 副作用(重篤でないもの)	☐ 他院処方(重複、相互作用)
	☐ 抗がん剤 (☐ 経口 ☐ 注射)	☐ オピオイド
	☐ 手技 (☐ 自己注射 ☐ 吸入薬 ☐ その他)	☐ その他()
情報提供・提案事項		
<p>1か月前よりリリカ®OD錠が50mg/day→100mg/dayに増量されています。 体操教室の指導者から、座位時の体の歪みと前傾歩行のために転倒リスクが増しているとの薬局に相談がありました。本人は歪みのことは自覚されていないようでしたが、倦怠感が強くなったと訴えておられました。 痺れについては増量後も変わらないとのことでした。 リリカ®OD錠の増量による影響かは判断しかねますが、医師に診察して頂くように提案しました。</p>		

薬剤部より

情報提供ありがとうございます。内容を確認し、電話にて主治医へ報告しました。

リリカ®OD錠75mg 半錠に減量の指示がありました。

(計100mg→62.5mg/day)

その後の経過

減量後の受診はまだ無いが

今後、減量による痺れの増強や倦怠感の改善について確認予定。

リリカ®OD錠増量による副作用が疑われたため、減量となった事例でした。
今回の事例のように急ぎの対応が必要と判断した場合は、電話にて医師に確認させていただきます。

事例②：処方変更前の残薬を自己判断で内服した事例

処方

69歳 女性 内科

ロスバスタチンOD錠5mg

1回1錠 1日1回 夕食後

マグミット®錠250mg

1回1錠 1日3回 毎食後

シルニジピン錠10mg

1回1錠 1日1回 朝食後

保険薬局より

副作用が出現しアムロジピンを中止していたが、血圧が高い時に自己判断で内服。

報告内容	☐ 薬剤継続の必要性について(ポリファーマシー等)	☒ 服薬状況
	☐ リフィル処方箋 ☐ 副作用(重篤でないもの)	☐ 他院処方(重複、相互作用)
	☐ 抗がん剤 (☐ 経口 ☐ 注射)	☐ オピオイド
	☐ 手 技 (☐ 自己注射 ☐ 吸入薬 ☐ その他)	☐ その他 ()
	情報提供・提案事項	
	現在の処方では血圧が高いとのことで、医師から次回受診時に血圧の低下がみられなければ追加と言われているとのことです。患者ご本人より時々、以前処方されたアムロジピンを自己判断で服用していることがあると聴取しました。医師に伝えているかどうかは定かではありません。血圧手帳には服用された日付の記載が無かったので、アムロジピンを服用せず、シルニジピンのみで血圧の低下がみられない時は医師に伝えるように患者さんに伝えました。	

薬剤部より

情報提供ありがとうございます。内容を確認し、カルテ記載で主治医へ報告しました。

その後の経過

受診時に医師がアムロジピンを自己判断で頓服しないように説明し、シルニジピン錠の用量を10mgから20mgへ増量。増量後の血圧は135/60mmHg前後で経過中。

患者さんが処方変更前の薬剤を自己判断で内服した事例でした。残薬を自己判断で内服しているなど主治医が十分に把握できていないことがあります。患者さんのアドヒアランスに問題がある場合は、トレーシングレポートの活用をお願いします。