

今回のトレーシングレポート通信は
処方変更の事例と服薬状況の事例です！

事例①：副作用による薬剤変更の事例

79歳 女性 整形外科 足趾痛のため内服開始


セレコキシブ錠100mg	1回	1錠	1日2回	朝・夕食後
レバミピド錠100mg	1回	1錠	1日2回	朝・夕食後
ミロガバリンベシル酸塩錠5mg	1回	1錠	1日2回	朝・夕食後

☞薬の服用後から嘔吐、胃の不快感、食欲低下、体重減少あり。

報告内容	<input type="checkbox"/> 薬剤継続の必要性について(ポリファーマシー等)	<input type="checkbox"/> 服薬状況
	<input type="checkbox"/> リフィル処方箋 <input type="checkbox"/> 副作用(重篤でないもの)	<input type="checkbox"/> 他院処方(重複、相互作用)
	<input type="checkbox"/> 抗がん剤 (<input type="checkbox"/> 経口 <input type="checkbox"/> 注射)	<input type="checkbox"/> オピオイド
	<input type="checkbox"/> 手 技 (<input type="checkbox"/> 自己注射 <input type="checkbox"/> 吸入薬 <input type="checkbox"/> その他)	<input checked="" type="checkbox"/> その他 ()
	情報提供・提案事項	
	薬の服用後から嘔吐があり、それ以降悪心、食欲低下、10日間で2kg程度の体重減少があるとのこと。薬は1日のみ服用し、その後は服用していないそうです。 薬局としても早めに受診していただいた方が良いと考えます。 3日後に予約外で診察に行かれるそうなので、確認していただくと幸いです。	

薬剤部より

情報提供ありがとうございます。内容を確認し、カルテ記載で主治医へ報告しました。



その後の経過

次回受診時にアセトアミノフェン錠200mg 1回2錠 1日3回 朝・昼・夕食後、ジクロフェナク坐剤25mg 頓用に変更。変更後は胃の不快感が改善し、食事が増加している。

保険薬局からの副作用の報告により薬剤が変更となり、食欲低下や胃の不快感等の副作用が改善された事例でした。
副作用が疑われる場合は服薬状況や症状などの情報提供をお願いします。

事例②：レンボレキサント錠で副作用疑いの事例

処方

69歳 女性 内科

プラバスタチンナトリウム錠10mg	1回1錠	1日1回	朝食後
レバミピド錠100mg	1回1錠	1日2回	朝夕食後
アジルサルタン錠20mg	1回1錠	1日1回	朝食後
レンボレキサント錠5mg	1回1錠	1日1回	寝る前


保険薬局より

👉レンボレキサント錠開始後より動悸やふらつきの訴えあり。

報告内容	<input type="checkbox"/> 薬剤継続の必要性について(ポリファーマシー等)	<input type="checkbox"/> 服薬状況
	<input type="checkbox"/> リフィル処方箋 <input checked="" type="checkbox"/> 副作用(重篤でないもの)	<input type="checkbox"/> 他院処方(重複、相互作用)
情報提供・提案事項	<input type="checkbox"/> 抗がん剤 (<input type="checkbox"/> 経口 <input type="checkbox"/> 注射)	<input type="checkbox"/> オピオイド
	<input type="checkbox"/> 手技 (<input type="checkbox"/> 自己注射 <input type="checkbox"/> 吸入薬 <input type="checkbox"/> その他)	<input type="checkbox"/> その他 ()
内容	<p>○月○日に初めて処方いただいたレンボレキサント錠5mgを服用された際、動悸やふらつきが現れ、その後、服用を躊躇してしまうというご相談がありました。初めて寝つきの薬を服用した、という気持ちの問題もあるかもしれないと患者ご本人様よりお話をしました。副作用か気持ちの問題かどうかの判別は薬局側ではできない旨をお伝えし、寝つきの薬のため無理をして服用する必要はないと考えられるため、服用できそうであれば様子を見ながら服用を、難しければ、休薬して様子を見るようにお伝えしました。次回受診時、患者ご本人より相談があると考えられるので、情報提供させていただきます。</p>	

薬剤部より

情報提供ありがとうございます。内容を確認し、カルテ記載で主治医へ報告しました。



その後の経過

次回受診時、レンボレキサント錠を中止後も不眠の訴えはなかったためレンボレキサント錠は中止となった。

新規追加となった薬剤で副作用の訴えがあった事例でした。副作用による内服中止に後に患者さんの原疾患の状態が変化する可能性があるため、患者さんのフォローアップをお願いします。フォローアップ中に服薬状況の経過や副作用発現等がありましたら、トレーシングレポートでの報告をご検討下さい。

事例③：便秘症状が出現したため市販薬を提案した報告

処方

73歳 女性

消化器内科

酸化マグネシウム錠250mg	1回2錠	1日2回	朝夕食後
モビコール®配合内容剤LD	1回1包	1日3回	毎食後
ポノプラザンフマル酸塩錠10mg	1回1錠	1日1回	朝食後

脳神経内科

ドネペジル塩酸塩錠3mg	1回1錠	1日1回	朝食後
レボドパカルビドパ水和物	1回0.5錠	1日3回	毎食後
ドロキシドパ錠100mg	1回1錠	1日3回	毎食後
アメジニウム錠5mg	1回1錠	1日2回	朝夕食後

外科

トレミフェンクエン酸塩錠40mg	1回1錠	1日1回	朝食後
------------------	------	------	-----


👉急に便が出にくくなった。

保険薬局より

報告内容	<input type="checkbox"/> 薬剤継続の必要性について(ポリファーマシー等)	<input type="checkbox"/> 服薬状況
	<input type="checkbox"/> リフィル処方箋 <input checked="" type="checkbox"/> 副作用(重篤でないもの)	<input type="checkbox"/> 他院処方(重複、相互作用)
	<input type="checkbox"/> 抗がん剤 (<input type="checkbox"/> 経口 <input type="checkbox"/> 注射)	<input type="checkbox"/> オピオイド
	<input type="checkbox"/> 手 枝 (<input type="checkbox"/> 自己注射 <input type="checkbox"/> 吸入薬 <input type="checkbox"/> その他)	<input checked="" type="checkbox"/> その他 (病状報告)
情報提供・提案事項		
<p>急に便通が悪くなり、以降コロコロ便しか出ていない。その3日後に本人から薬局にご相談あり、通販で購入したモリモリスリム®(ハーブ茶)を服用開始するよう提案した。さらに4日後、他の用事で来局し、モリモリスリム®服用後も便通に変化なしと伺った。貴院の酸化マグネシウム錠とモビコール®配合内容剤LDは指示通りに服用中であるが、予てから著効しているという感覚はなかったとのこと。今の状況が続くなら市販の浣腸等の購入を検討中と本人は言われている。そこで、便が出にくくなった件について次回直接医師に相談いただくようにのご案内をしております。対応のほど宜しく願いいたします。</p>		

薬剤部より

情報提供ありがとうございます。
内容を確認し、カルテにて主治医へ報告しました。



その後の経過

次回受診時、大建中湯エキス顆粒 7.5g 3×毎食後が追加となり、その後便秘症状は改善した。

急な便秘症状の出現に対して市販薬を提案し対応した症例でした。トレーシングレポートによる情報提供があったため、外来受診時にスムーズに対応できました。