

今回のトレーシングレポート通信は残薬調整の事例と副作用の事例です！

No.23
2024年3月号

事例①：症状の改善により残薬調整となった事例

処方

67歳 男性 内科			
レンボレキサント錠5mg	1回1錠	1日1回	寝る前
オシメルチニブメシル酸塩錠80mg	1回1錠	1日1回	朝食後
デノタス®チュアブル配合錠	1回1錠	1日1回	朝食後
ボノプラザン錠10mg	1回1錠	1日1回	朝食後
ロキソプロフェン錠60mg	1回1錠	1日3回	朝・昼・夕食後
ヘモポリゾン軟膏	痛い時	1回1個	使用


☞不眠が改善した為、残薬あり。

保険薬局より

報告内容	☐ 薬剤継続の必要性について(ポリファーマシー等)	☐ 服薬状況
	☐ リフィル処方箋 ☐ 副作用(重篤でないもの)	☐ 他院処方(重複、相互作用)
	☐ 抗がん剤 (☐ 経口 ☐ 注射)	☐ オピオイド
	☐ 手 技 (☐ 自己注射 ☐ 吸入薬 ☐ その他)	☒ その他 ()
情報提供・提案事項		
レンボレキサント錠 5 mgを服用しなくても寝られており、残薬があるため今回は不要とのことです。削除したのでよろしくお願いします。		

薬剤部より

情報提供ありがとうございます。
内容を確認し、カルテ記載で主治医に報告しました。



その後の経過

次回受診時、不眠の訴えなし。

残薬調整はトレーシングレポートをご活用下さい。その際には残薬が発生した理由を併せてご報告をお願いします。
また、症状が改善し処方が不要となる場合もご報告ください。

事例②：痒みの副作用が発現した事例

処方

72歳 女性 内科

メトホルミン塩酸塩錠250mg

1回3錠 1日2回 朝夕食後

ミグリトールOD錠50mg

1回1錠 1日3回 毎食直前

ロサルタンカリウム配合錠LD

1回1錠 1日1回 朝食後

アムロジピンベシル酸塩OD錠5mg

1回1錠 1日1回 朝食後

アトルバスタチンカルシウム水和物OD錠10mg

1回1錠 1日1回 夕食後

シタグリプチンリン酸塩水和物錠50mg

1回1錠 1日1回 朝食後

グリメピリドOD錠0.5mg

1回1錠 1日1回 朝食後


保険薬局より

👉 シタグリプチンリン酸塩水和物錠、グリメピリドOD錠の服用を開始してから背中中に痒みあり。

報告内容	☐ 薬剤継続の必要性について(ポリファーマシー等)	☐ 服薬状況
	☐ リフィル処方箋 ☒ 副作用(重篤でないもの)	☐ 他院処方(重複、相互作用)
	☐ 抗がん剤 (☐ 経口 ☐ 注射)	☐ オピオイド
	☐ 手 技 (☐ 自己注射 ☐ 吸入薬 ☐ その他)	☐ その他 ()
	情報提供・提案事項	
	2週間ほど前から背中に痒みがでている。シタグリプチンリン酸塩水和物錠とグリメピリドOD錠の処方が開始されたタイミングのため、その影響ではないかと思ひ連絡。(因みに14年前にグリメピリドOD錠を服用していた時期があるが、その時は何も起きなかったので、シタグリプチンリン酸塩水和物錠の影響だとお考えです。) 元々体調変化や副作用に過敏な方です。ご参考までに過去にも副作用を疑い、処方の変更となった履歴があるので下記に記載させていただきます。 2年前 エンパグリフロジン錠10mgが陰部の痒みにより内服中止。 1年前 セマグルチド錠3mgが胃障害により内服中止。 今回自覚している痒みは軽度なので、自宅にあるムヒを塗りながら経過観察してもらうことになりました。症状が増悪するようなことがあれば、連絡していただくこととなっています。	

薬剤部より

情報提供ありがとうございます。内容を確認し、カルテ記載で主治医へ報告しました。



その後の経過

次回受診時に掻痒感があるのは時々のため、シタグリプチンリン酸塩水和物錠、グリメピリドOD錠の両薬剤とも内服継続となった。

副作用が疑われたが、軽微な副作用と主治医が判断したため内服継続となった事例でした。
副作用が疑われた場合はトレーシングレポートで情報提供をお願いします。

事例③：自己調節して内服していた薬剤の残薬調整

処方

77歳 男性 消化器内科			
アムロジピンベシル酸塩錠5mg	1回1錠	1日1回	朝食後
酸化マグネシウム錠250mg	1回2錠	1日3回	毎食後
ロキソプロフェンNa錠60mg	1回1錠	1日3回	毎食後
ランソプラゾール錠15mg	1回1錠	1日1回	朝食後
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒	1回2.5g	痙攣時	
フルビプロフェンテープ20mg	1日1回1枚		

アムロジピンベシル酸塩錠5mg	1回1錠	1日1回	朝食後
酸化マグネシウム錠250mg	1回2錠	1日3回	毎食後
ロキソプロフェンNa錠60mg	1回1錠	1日3回	毎食後
ランソプラゾール錠15mg	1回1錠	1日1回	朝食後
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒	1回2.5g	痙攣時	
フルビプロフェンテープ20mg	1日1回1枚		

1回1錠	1日1回	朝食後
1回2錠	1日3回	毎食後
1回1錠	1日3回	毎食後
1回1錠	1日1回	朝食後
1回2.5g	痙攣時	
1日1回1枚		

1回2錠 1日3回 毎食後

1回2錠 1日3回 毎食後
1回1錠 1日3回 毎食後
1回1錠 1日1回 朝食後
1回2.5g 痙攣時
1日1回1枚

1回1錠 1日3回 毎食後

1回1錠 1日3回 毎食後
1回1錠 1日1回 朝食後
1回2.5g 痙攣時
1日1回1枚

1回1錠 1日1回 朝食後

1回1錠 1日1回 朝食後
1回2.5g 痙攣時
1日1回1枚

1回2.5g 痙攣時

1回2.5g 痙攣時
1日1回1枚

1日1回1枚

1日1回1枚

👉ロキソプロフェンNa錠とランソプラゾール錠の残薬が多くある。

保険薬局より

☐ 薬剤継続の必要性について(ポリファーマシー等)	☒ 服薬状況
☐ リフィル処方箋 ☐ 副作用(重篤でないもの)	☐ 他院処方(重複、相互作用)
☐ 抗がん剤 (☐ 経口 ☐ 注射)	☐ オピオイド
☐ 手　　技 (☐ 自己注射 ☐ 吸入薬 ☐ その他)	☐ その他 ()

☒ 服薬状況

☐ 他院処方(重複、相互作用)

☐ オピオイド

☐ その他 ()

☐ リフィル処方箋 ☐ 副作用(重篤でないもの) ☐ 他院処方(重複、相互作用)

☐ 抗がん剤 (☐ 経口 ☐ 注射) ☐ オピオイド

☐ 手 技 (☐ 自己注射 ☐ 吸入薬 ☐ その他) ☐ その他 ()

☐ 他院処方(重複、相互作用)

☐ オピオイド

☐ その他 ()

☐ 抗がん剤 (☐ 経口 ☐ 注射) ☐ オピオイド

☐ 手 技 (☐ 自己注射 ☐ 吸入薬 ☐ その他) ☐ その他 ()

☐ オピオイド

☐ その他 ()

☐ 手 技 (☐ 自己注射 ☐ 吸入薬 ☐ その他) ☐ その他 ()

☐ その他 ()


情報提供・提案事項

ロキソプロフェンNa錠とランソプラゾール錠は調整して服用されており、長年の間に余ってきたので今回は不要とのことです。

ロキソプロフェンNa錠とランソプラゾール錠は調整して服用されており、長年の間に余ってきたので今回は不要とのことです。

薬剤部より

情報提供ありがとうございます。
内容を確認し、カルテにて主治医へ報告しました。



その後の経過

疼痛の訴えなく経過しており、次回外来受診よりロキソプロフェンNa錠とランソプラゾール錠の処方中止。

鎮痛薬など自己調節して内服している薬剤は残薬となる場合が多く、用法変更などの検討が必要です。残薬が多い薬剤がある場合は、トレーシングレポートで情報提供をお願いいたします。